<p>RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI</p>		<p>PANDUAN PRAKTEK KLINIK Persalinan Preterm (Kurang Bulan)</p>		
<p>PANDUAN PRAKTEK KLINIK</p>		<p>No. Dokumen 445/18 /SPO-RSAM/2024</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 1</p>
<p>PENGERTIAN</p>		<p>Tanggal terbit 05 Jan 2024</p> <div style="text-align: center;"> <p>drg. BUSRIL, MPH Nip. 197402272002121004</p> </div>		
<p>ANAMNESIS</p>		<p>Persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung antara umur kehamilan 24-36 (+ 6hr) minggu dari hari pertama haid terakhir (HPHT) atau antara hari ke 140 dan 259 dengan berat lahir janin kurang dari 2500 gram.</p> <p>1. Mules-mules lebih dari 6 kali dalam 1 jam 2. Rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah (kram perut, sakit pinggang hilang timbul 3. Peningkatan atau perubahan cairan vagina 4. Perdarahan atau bercak dari vagina</p> <p>Faktor risiko terjadinya persalinan preterm yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuban pecah dini (KPD), korioamnionitis, bakteriuri, kolonisasi mikroorganisme pada genital (Grup.β streptokokus; dll) 2. Riwayat persalinan preterm atau kontraksi persalinan preterm sebelumnya. 3. Riwayat abortus sebelumnya (Abortus 2 x pada trimester kedua). 4. Riwayat abortus iminens pada kehamilan ini. 5. Perdarahan antepartum; plasenta previa/solusio plasenta. 6. Hipertensi dalam kehamilan. 7. Serviks inkompeten atau riwayat tindakan konisasi 8. Kelainan uterus (jarang). 9. Operasi abdomen waktu kehamilam. 10. Janin mati, kelainan kongenital. 11. Kerentanan uterus yang bertambah. 12. Penyakit ibu terutama penyakit infeksi sistematik yang berat. 13. Kehamilan dengan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) insitu. 14. Pielonefritis 15. Kehamilan ganda, polihidramnion, oligohidramnion. 16. Kelainan letak. 17. Diabetes melitus. 18. Penyalahgunaan/kecanduan NAZA (narkotik dan zat aditif lainnya) 19. Trauma fisik/psikis. 		
<p>PEMERIKSAAN FISIK</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontraksi uterus regular lebih dari 6 kali per jam 2. Pembukaan serviks > 3 cm

RSUD Dr ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PANDUAN PRAKTEK KLINIK
Persalinan Preterm (Kurang Bulan)

No. Dokumen
445/181 /SPO-RSAM/2024

No. Revisi
01

Halaman
1

**KRITERIA
DIAGNOSIS**

Perlu dilakukan penilaian terhadap ada tidaknya komplikasi seperti :

1. Riwayat Preterm birth pada kehamilan sebelumnya
2. Plasenta previa
3. Keadaan ketuban (intak atau sudah pecah)
4. Korioamnionitis
5. Infeksi sistemik
6. Polihidramnion
7. Kehamilan multipel
8. Riwayat obstetri sebelumnya

DIAGNOSIS KERJA

Persalinan Preterm (Kurang Bulan)

**DIAGNOSIS
BANDING**

Ancaman persalinan preterm

Evaluasi klinis pasien dengan kemungkinan persalinan preterm

1. Pasien dengan gejala dan tanda persalinan preterm

- Kontraksi uterus regular (lebih 6x dalam 1 jam)
- Kram perut, penekanan panggul, nyeri pinggang hilang timbul
- Peningkatan atau perubahan dari cairan vagina
- Perdarahan pervaginam atau bercak

2. Pemeriksaan serviks (setelah ketuban pecah dieksklusi)

- Dilatasi serviks lebih dari 3 cm dan penipisan $\geq 80\%$.

Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan, evaluasi untuk pemberian tokolisis

- Dilatasi serviks 2-3 cm dan penipisan $< 80\%$

Diagnosis persalinan preterm kemungkinan besar terjadi namun belum dapat ditegakkan. Monitor frekuensi kontraksi uterus dalam 30-60 menit. Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan apabila terdapat perubahan serviks.

- Dilatasi serviks kurang dari 2 cm dan penipisan $< 80\%$

Diagnosis persalinan preterm tidak menentu. Monitor frekuensi kontraksi uterus dan evaluasi ulang pemeriksaan serviks dalam 1-2 jam. Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan apabila terdapat perubahan dilatasi serviks lebih dari 1 cm, penipisan $>80\%$ atau panjang serviks ≤ 20 mm.

3. Pemeriksaan Ultrasonografi serviks (transvaginal)

- Panjang serviks < 20 mm dengan gejala kontraksi: persalinan preterm
- Panjang serviks 20-30 mm dengan gejala kontraksi: kemungkinan terjadi persalinan preterm
- Panjang serviks > 30 mm: persalinan preterm kemungkinan besar tidak terjadi walaupun terdapat kontraksi uterus reguler

**PEMERIKSAAN
PENUNJANG**

USG, KTG, pemeriksaan Lab yang diperlukan (darah dan urine rutin), Pemeriksaan tambahan : ultrasonografi untuk menilai presentasi, biometrijanin, anomali, velositas arteri umbilikalis (Doppler), cairan amnion (SDP), pemeriksaan plasenta, morfologi serviks (panjang, diameter kanalis servikalis dan ada tidaknya funelling).

RSUD Dr ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PANDUAN PRAKTEK KLINIK
Persalinan Preterm (Kurang Bulan)

No. Dokumen
445/182/SPO-RSAM/2024

No. Revisi
01

Halaman
1

TERAPI

Pengelolaan :

1. Konfirmasi umur kehamilan dengan berbagai cara HPHT, CRL, Biometri (BPD, HC, AC, FL, HL dan DC/distancia cerebellum) → menilai fetal well being dengan USG Fetomaternal
2. Penilaian kontraksi uterus (lamanya, intensitasnya, frekuensinya dan pengaruhnya terhadap pembukaan serviks) → dibuktikan dengan pemeriksaan KTG
3. Pemantauan tanda-tanda vital ibu
4. Pemantauan bunyi jantung janin
5. Bila ada korioamnionitis, lakukan kultur dan berikan antibiotik.
6. Pemberian obat-obatan pematangan paru-paru janin :
Diberikan pada semua wanita hamil antara 24-34 minggu

- Dilatasi serviks kurang dari 2 cm dan penapisan < 80%

Diagnosis persalinan preterm tidak menentu. Monitor frekuensi kontraksi uterus dan evaluasi ulang pemeriksaan serviks dalam 1-2 jam. Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan apabila terdapat perubahan dilatasi serviks lebih dari 1 cm, penipisan >80% atau panjang serviks <20 mm.

3. Pemeriksaan Ultrasonografi serviks (transvaginal)

- Panjang serviks <20 mm dengan gejala kontraksi: persalinan preterm
- Panjang serviks 20-30 mm dengan gejala kontraksi: kemungkinan terjadi persalinan preterm
- Panjang serviks >30 mm: persalinan preterm kemungkinan besar tidak terjadi walaupun terdapat kontraksi uterus reguler USG, KTG, pemeriksaan Lab yang diperlukan (darah dan urine rutin),

Pemeriksaan tambahan : ultrasonografi untuk menilai presentasi, biometri janin, anomali, velositas arteri umbilikalis (Doppler), cairan amnion (SDP), pemeriksaan plasenta, morfologi serviks (panjang, diameter kanalis servikalis dan ada tidaknya funelling).

Pengelolaan :

1. Konfirmasi umur kehamilan dengan berbagai cara HPHT, CRL, Biometri (BPD, HC, AC, FL, HL dan DC/distancia cerebellum) → menilai fetal well being dengan USG Fetomaternal
2. Penilaian kontraksi uterus (lamanya, intensitasnya, frekuensinya dan pengaruhnya terhadap pembukaan serviks) → dibuktikan dengan pemeriksaan KTG
3. Pemantauan tanda-tanda vital ibu
4. Pemantauan bunyi jantung janin
5. Bila ada korioamnionitis, lakukan kultur dan berikan antibiotik.
6. Pemberian obat-obatan pematangan paru-paru janin :

Diberikan pada semua wanita hamil antara 24-34 minggu

- Deksametason, 6 mg tiap 12 jam (i.m) sampai 4 dosis
- Betametason, 12 mg (i.m) sampai 2 dosis dengan interval 24 jam
- 7. Pemberian MgSO₄ untuk proteksi otak janin :

RSUD Dr ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PANDUAN PRAKTEK KLINIK
Persalinan Preterm (Kurang Bulan)

No. Dokumen
445/182/SPO-RSAM/2024

No. Revisi
01

Halaman
1

Loading dose 4 gram MgSO₄ (10 cc MgSO, 40 %) dilarutkan kedalam 100 cc ringer laktat, diberikan selama 15-20 menit. Setelah habis loading dose dilanjutkan dengan dosis rumatan 8 gr dilarutkan dalam 500 cc RL. Tetesan 20 gtt/menit selama 4 jam 8. Persalinan per abdomen hanya atas indikasi obstetri

**LAMA
PERAWATAN**

5-7 hari

**KRITERIA
PEMULANGAN
PASIE**

Kondisi pasien stabil

EDUKASI

Risiko bayi preterm (RDS, NEC, Retinopati)
Perawatan bayi preterm, ASI eksklusif

PROGNOSIS

Ibu ad bonam
Bayi dubia

TINGKAT EVIDENS

I/II/III/IV

**TINGKAT
REKOMENDASI**

A/B/C

PENELAAH KRITIS

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

KEPUSTAKAAN

1. Konsensus asma (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 2017)