



RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi

PEMASANGAN NGT (*nasogastric tube*) / OGT (*orogastric tube*) PADA BAYI DAN ANAK

No Dokumen

SPO/1165

Revisi

0

Halaman

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL (SPO)

Tanggal terbit

4 Januari 2023



Ditetapkan oleh Direktur

Drg. Busril, MPH

197402272002121004

PENGERTIAN

Memasukkan selang NGT (*nasogastric tube*) melalui hidung / OGT (*orogastric tube*) melalui mulut pada neonatus / bayi / anak.

TUJUAN

Sebagai acuan petugas melakukan tindakan untuk :

1. Memasukkan nutrisi atau obat oral pada pasien dengan masalah gangguan menelan
2. Mengeluarkan cairan lambung
3. Mengambil spesimen lambung
4. Dekompresi lambung
5. Membantu menegakkan diagnosis

KEBIJAKAN

Pedoman pelayanan dan asuhan nutrisi dan pasien dengan gangguan menelan

Pedoman pelayanan pemeriksaan BTA cairan lambung

PROSEDUR

1. Lakukan cuci tangan
2. Identifikasi pasien
3. Siapkan dan dekatkan alat ke pasien

Persiapan alat :

- a. Selang NGT/OGT sesuai ukuran
- b. Spuit 3-5 cc
- c. Tissue
- d. Plester dan gunting

	e. Sarung tangan bersih f. Xylocain jelly 2% g. Stetoskop h. Penampung cairan lambung (bila ada indikasi dekompresi/lavage) 4. Jaga privasi pasien 5. Atur posisi pasien 6. Pakai sarung tangan 7. Ukur panjang NGT dengan cara a. Dari ujung hidung ke telinga atas sampai prosesus xipoid (px) bila dimasukkan melalui hidung (nasal) b. Dari telinga ke hidung sampai PX bila melalui oral 8. Beri tanda pada selang yang telah di ukur dengan plester 9. Berikan xylocainne jelly pada ujung NGT/OGT 10. Masukkan selang NGT/OGT ke nasal/oral sesuai indikasi secara perlahan sampai dengan batas yang telah ditandai 11. Jika ada tekanan atau sumbatan diamkan beberapa saat dan masukkan lagi 12. Setelah masuk cek posisi NGT/OGT dengan cara masukkan udara dengan spuit 3-5 cc kedalam lambung, jika terdengar bunyi "blub" perauskultasi, berarti ujung selang sonde berada dalam lambung kemudian udara tadi diaspirasi kembali 13. Untuk fiksasi selang, pada hidung atau pipi pasien, perhatikan kerapihan dan kenyamanan pasien 14. Perhatikan indikasi pemasangan, bila untuk nutrisi, tutup selang 15. Rapikan pasien 16. Lakukan cuci tangan 17. Lakukan pendokumentasian 18. Jangka waktu pemasangan selang NGT/OGT yang terbuat dari Polyvinyl Chloride (PVC) hanya selama 7 hari, setelah itu selang harus diganti, penggantian bisa lebih cepat bila NGT/OGT terlepas atau ditemukan tanda-tanda infeksi.
UNIT TERKAIT	- Ruang Poliklinik anak - Ruang rawat inap anak dan perinatalogi IGD